


# บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม

## การบริโภคยาสูบ



การผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสูบนำไปสู่การผลิตของเสีย เช่น ตัวทำละลาย สารละลายน้ำมัน ไม้ พลาสติก กระดาษ และของเสียจากสารเคมีที่เป็นพิษ (ASH 2000) การกำจัดกันบุหรี่ ถุงบรรจุยาสูบ ซองและกล่องบุหรี่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ ทำให้เกิดของเสีย กันบุหรี่จำนวนมากถูกทิ้งระหว่างการทำความสะอาดชายฝั่ง (Novotry และ Zhao 1999)

ในการทำความสะอาดชายฝั่งทะเลระหว่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2556 ซึ่งจัดขึ้นใน 92 ประเทศ พบว่า กันบุหรี่เป็นขยะที่พบได้บ่อยที่สุดและคิดเป็นร้อยละ 15 ของขยะทั้งหมด (Ocean Conservancy 2013) น้ำปนเปื้อนขยะจากกันบุหรี่เป็นพิษร้ายแรงต่อปลาทะเลและปลาน้ำจืดบางชนิด แม้ตัวกรองที่ไม่ได้รมควัน ก็เป็นพิษเช่นกัน (Slaughter และคณะ 2011) นอกจากนี้ กันบุรียังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสัตว์ โดยเฉพาะฉลามในประเทศในเอเชียใต้บางประเทศที่เดินเตร่กินขยะอยู่ตามท้องถนน เด็กเล็กอาจกลืนกันบุหรี่เข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งนี้ ตัวกรองบุหรี่ จะไม่เสื่อมสลายและคงอยู่เป็นเวลากว่า 5-7 ปี ดังนั้น จึงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก (Buckley 1996)



**สัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบ  
จากผลิตภัณฑ์ยาสูบ**